# EVITER LA CAUDOPHAGIE EN DETECTANT ET LIMITANT LE STRESS

La caudophagie , ou comportement de morsure de la queue d'un autre porc, peut apparaitre autant chez des porcs à queue coupée que chez des porcs à queue intacte. Pour un porc, le comportement de mordre les autres porcs est le résultat de diverses motivations comportementales

Les morsures entre les porcs, et notamment à la queue, entraînent des douleurs importantes pour l'animal, dégradent son état de santé et induisent des pertes économiques.



Entre 1% et 90%

des porcs à queue non coupée peuvent être victimes de caudophagie à divers degrés selon les essais.

**Comprendre l'origine des morsures** : Les morsures de queue peuvent être le fruit de diverses motivations comportementales du porc mordeur.

26-30 juillet 2016

# Tout se joue dès les premiers signes

À la station expérimentale de Crécom, les Chambres d'agriculture de Bretagne montrent qu'il est possible d'élever des porcs à queue intacte, à condition d'adopter une conduite d'élevage très réactive.

CAUDOPHAGIE

La station expérimentale de Crécom, gérée par la Chambre d'agriculture de Bretagne (Cab), a évalué la faisabilité d'un élevage de porcs à queue intacte tout en maîtrisant les risques de caudophagie. Les essais ont été menés sur 540 porcs élevés sur paille et 885 porcs élevés sur caillebotis, suivis de la période post-sevrage jusqu'à l'abattage.

## Moins de lésions sur paille

Sur paille, un seul cas de caudophagie sévère a été observé au cours de l'étude. À Crécom, la coupe des queues a d'ailleurs été abandonnée depuis 4 ans chez les porcs élevés sur paille.

L'étude a montré qu'une queue basse était un signal d'alerte.



Paysan Breton

En système sur caillebotis, la maîtrise du risque s'avère plus complexe. Même lorsque les facteurs de risque sont correctement gérés, des épisodes de caudophagie peuvent apparaître dans n'importe quelle case. Les essais mettent toutefois en évidence un indicateur précoce particulièrement fiable : une queue portée basse annonce souvent un épisode de morsures plusieurs jours avant l'apparition de lésions importantes. *« Nous avons également observé que la caudophagie survient principalement durant la période post-sevrage et que certaines lésions peuvent cicatriser au cours de la phase d'engraissement »*, indique Claudie Guyomarch, directrice de la station de Crécom. Pour limiter ces épisodes, les techniciens préconisent une gestion globale associant enrichissement progressif du milieu de vie, retrait rapide des animaux concernés (mordus et mordeurs), et soins apportés aux animaux blessés directement dans les cases. Chez les porcs élevés avec la queue intacte, la réussite repose donc avant tout sur la capacité de l'éleveur à observer ses animaux et à détecter les premiers signes de caudophagie. La détection précoce reste le levier le plus efficace pour limiter la fréquence et la gravité des épisodes. **Alexis Jamet**